

**Recomanacions per a l'administració del paracetamol als
infants a les escoles**

**Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l'autorització del
pare, mare o tutor.**

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37°C que sovint s'acompanya de malestar. És molt freqüent en l'infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l'organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d'un infant amb febre de 38 °C o més l'escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.

Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 °C es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d'efectes secundaris.

Encara que no es tracti d'una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l'escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Recomanacions elaborades per la **Societat Catalana de Pediatria** i pel **Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya**.

AUTORITZACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL

El Sr/a _____, com a pare/mare/ o tutors/a de
l'alumne/a: _____ que cursa _____.

Autoritzo a l'**Escola Antoni Brusi** a administrar al meu fill/a paracetamol en cas de presentar febre superior a 38^a C de temperatura corporal mentre s'espera l'arribada d'algun familiar que el pugui portar a casa.

A Barcelona,

Signatura